

MILDIOU

AVERTISSEMENTS AGRICOL

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION CENTRE

Edition Cultures Spéciales

Supplément N° 46 au Bulletin technique N° 25.

24 Août 1994

- EDITION VIGNE 23 -

Toujours de nouvelles taches sur jeunes feuilles en vignes déjà atteintes. BLACK-ROT Situation stable; n'intervenez plus. BOTRYTIS **OIDIUM** Activité résiduelle d'Eudémis sans conséquence pour la VERS DE LA GRAPPE récolte. Toujours à surveiller. **ACARIENS** Stades larvaires trop évolués pour une bonne rentabilité des CICADELLES

traitements.

A moins d'évènements exceptionnels, ce bulletin est le dernier à vous être adressé avant la récolte.

Malgré les situations localement très difficiles que nombre d'entre vous ont pu connaître, gel ou grêle, nous vous souhaitons quand même

> **BONNES VENDANGES ET** UN BON MILLESIME 1994

* BLACK-ROT *

Situation stabilisée sans nouvelles taches. A partir de la véraison, les attaques sur grappes sont moins graves ; il n'est plus nécessaire d'envisager de traitement.

* STADES PHENOLOGIQUES *

Véraison en cours sur tous cépages. La mivéraison n'est pas encore dépassée.

* MILDIOU *

Seules les parcelles fortement infestées, où de nouvelles taches continuent d'apparaître, pourront recevoir une dernière intervention cymoxanil + cuivre pour limiter l'inoculum hivernal, notamment en jeunes vignes sans récolte.

* BOTRYTIS *

Les dernières applications sur cépages tardifs ont dû être réalisées.

* OIDIUM *

Quelques attaques sur grappes tardives (floraison de 2ème ou 3ème génération) sont observées à Gien (45).

Les grappes vérées sont maintenant résistantes à l'Oïdium. N'intervenez plus.



8

Imprimerie de la Stat

aragriculture a forêt

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX CENTRE 93, rue de Curambourg - BP 210 - 45403 FLEURY LES AUBRAIS Cédex



* VERS DE LA GRAPPE *

Malgré un sursaut du 3ème vol d'Eudémis à St Romain/Cher (41), Gien (45) et une dernière vague de pontes à St Nicolas de Bourgueil (37), plus aucune intervention ne sera réalisée, cette activité résiduelle des Vers de la grappe ne présentant pas de risque réel pour la vendange.

* ACARIENS *


Des populations d'Acariens rouges (Montlouis -37-) ou jaunes (Gien -45-) sont signalées. L'abaissement des températures va ralentir leur développement.

N'intervenez que si le seuil de 30 % de feuilles occupées est dépassé, en choisissant les produits en fonction du délai avant récolte.

* CICADELLES *

Elles sont présentes dans quelques vignes, mais le stade dominant (larves âgées et adultes) rend aléatoire la rentabilité d'une intervention.

La santé des cultures contribue à la santé des hommes



Respectons les doses et les délais avant récolte